С.А. Карпищенко, Е.Б. Катинас, Н.А. Шумилова

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова

Цефтибутен — пероральный цефалоспорин III поколения при лечении острого тонзиллофарингита и отита

Contacts:

Karpishchenko Sergei Anatol'evich, PhD, professor, Head of the Department of Otolaryngology of academician I.P. Pavlov St. Petersburg State Medical University

Address: 197022, Sankt-Peterburg, ul. L'va Tolstogo, d. 6/8, Tel.: (812) 499-70-19

Article received: 23.03.2012, Accepted for publication: 12.04.2012

Тонзиллофарингит — широко распространенное полиэтиологическое инфекционное заболевание, наиболее частая причина развития которого — стрептококковая инфекция. Открытие и внедрение в клиническую практику оральных цефалоспоринов III поколения существенно расширило возможности лечения инфекционно-воспалительных заболеваний, в том числе и тонзиллофарингита. Одним из представителей группы цефалоспоринов III поколения является цефтибутен (Цедекс) — препарат с β -лактамными свойствами, ингибирующий синтез пептидогликана бактерий. Он оказывает относительно длительный постантибиотический эффект, характеризуется высокой активностью в отношении большинства представителей энтеробактерий, высокоустойчив к разрушающему действию β -лактамаз и обладает свойством накапливаться в тканях, обеспечивая высокую концентрацию действующего вещества в очаге воспаления. Эффективная доза препарата для взрослых составляет 400 мг/сут. Цефтибутен рекомендован и эффективно применяется в педиатрической практике при лечении тонзиллофарингита и отита.

Ключевые слова: цефтибутен, цефалоспорины III поколения, отит, тонзиллофарингит, стрептококк, β -лактамы антибиотиков.

В соответствии с Международной классификацией болезней X пересмотра выделяют «Стрептококковый фарингит» (J02.0) и «Стрептококковый тонзиллит» (J03.0). В зарубежной литературе широко используют взаимозаменяемые термины «тонзиллофарингит» и «фарингит». В дальнейшем нами будет употребляться термин «тонзиллофарингит», под которым понимают острый тонзиллит (ангину) или фарингит.

Заболеваемость тонзиллофарингитом составляет, по разным данным, от 5 до 40% [1]. Важность проблемы тонзиллофарингита обусловлена ролью миндалин в формировании механизмов специфической и неспецифической защиты организма ребенка в процессе его роста, а также развитием хронического тонзиллита. В России доля детей с хроническим тонзиллитом составляет от 4 до 9% [2]. В группе часто болеющих

S.A. Karpitchshenko, E.B. Katinas, N.A. Shumilova

St. Petersburg State I.P. Pavlov Medical University

Oral III generation cephalosporin Ceftibuten in treatment of acute tonsillopharyngitis and otitis

Tonsillopharyngitis is a common multi-etiological infectious disease, more often caused by streptococci infection. The development and adoption of oral III generation cephalosporins into clinical practice significantly widened the possibilities of treatment of inflammatory-infectious diseases, including tonsillopharyngitis. One of the III generation cephalosporins is Ceftibuten (Cedax) — a drug with β -lactam properties, which inhibits bacterial peptidoglycan synthesis. It has relatively long post-antibiotic effect, characterized by high activity in point of majority of enterobacteria, and is very stable to destructive action of β -lactamases. It also can be accumulated in tissues, providing high concentration of active substance in inflammation nidus. The therapeutic dose of the drug for adults is 400 mg/day. Ceftibuten is recommended and effectively used in pediatric practice in treatment of tonsillopharyngitis and otitis.

Key words: ceftibuten, III generation cephalosporines, otitis, tonsillopharyngitis, streptococcus, β -lactam antibiotics.

детей (каждый четвертый ребенок) тонзиллофарингит составляет 43% [3].

Роль миндалин как исходного очага патологических импульсов и токсико-инфекционных влияний на другие системы и органы хорошо известна. Тонзиллофарингит вызывает ряд тяжелых осложнений (местных — паратонзиллит, парафарингит и др., и общих — острая ревматическая лихорадка, инфекционный полиартрит, острый и хронический тонзиллогенный сепсис, приобретенные заболевания сердца, мочевыделительной системы, суставов и др.) [1].

Основой консервативного лечения тонзиллофарингита, конечно, является этиотропное лечение, т.е. антибиотикотерапия. Системная антибиотикотерапия должна быть назначена не только при остром тонзиллофарингите и обострении хронического тонзиллита, но и при токсико-аллергических формах хронического тонзиллита вне обострения, при риске развития осложнений.

Как известно, острый тонзиллофарингит — полиэтиологичное заболевание. Среди патогенов при тонзиллите наиболее часто обнаруживают стрептококки, стафилококки, пневмококки, гемофильную палочку, моракселлу, аденовирусы, вирус Эпштейна–Барр, коксаки-вирусы, вирус герпеса, различные анаэробы, микоплазмы, хламидии, грибы [4]. Однако наиболее доказанной в этиологии бактериального тонзиллита является роль β -гемолитического стрептококка группы А (БГСА) [5]. По данным Национального центра ВОЗ по стрептококкам и стрептококковым заболеваниям Отдела молекулярной микробиологии ГУ НИИ экспериментальной медицины РАМН, наиболее часто встречающимся микроорганизмом, обнаруживаемым как на поверхности небных миндалин при тонзиллофарингите, так и в лакунах, оказался золотистый стафилококк (*Staphylococcus aureus*) — 70 и 66%, соответственно. Далее по частоте выявления следуют β -гемолитические стрептококки, диагностированные в 46% случаев на поверхности небных миндалин и слизистой оболочки глотки, и в 40% — в содержимом лакун [6].

По данным бактериологического исследования, проведенного на кафедре оториноларингологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, у больных тонзиллофарингитом из надминдаликовой ямки высеяны бактерии: *S. aureus* в 50%, *Streptococcus pyogenes* в 30%, а в 17% случаев выявлены и тот, и другой возбудитель. Во всех случаях возбудители присутствуют в ассоциациях со стрептококками группы *Viridans* (77%), с бактериями рода *Neisseria* (83%), с коринеформными бактериями (10%), *Staphylococcus epidermidis* (3%) и *Actinomyces spp.* (3%). Важный аспект занижения частоты обнаружения стрептококковой инфекции при тонзиллофарингите — феномен внутриклеточной персистенции стрептококков в ткани небных миндалин. Известно, что стрептококк, являясь экстрацеллюлярным патогеном, продуцирует и многочисленные инвазивные факторы, позволяющие проникать в тонзиллярные эпителиальные клетки [7, 8].

А. Osterlund (1998) обнаружил, что небные миндалины у детей с рецидивирующим тонзиллитом содержат стрептококки, находящиеся внутри клеток, и предположил, что этот лимфоидный орган может быть резервуаром для рецидивирующих инфекций [6]. Обнаружено присутствие БГСА в посеве отделяемого небных миндалин [9, 10]. В этом случае БГСА не может быть диагностирован обычными культуральными методами.

Для лечения всех форм заболеваний, вызванных БГСА, обычно применяют препараты пенициллина, к которому сохраняется высокая чувствительность микроба. Однако на практике нередко наблюдается отсутствие эффекта от природных и синтетических пенициллинов. Это обусловлено рядом причин: у большинства больных с тонзиллитом β -гемолитические стрептококки встречаются в ассоциации с золотистым стафилококком, именно поэтому БГСА, чувствительный к β -лактамам *in vitro*, будет устойчив к указанной группе антибактериальных препаратов *in vivo* в связи с тем, что ассоциированный с ним золотистый стафилококк вырабатывает β -лактамазу [11], инактивирующую действие пенициллинов. Именно поэтому более адекватным подходом при лечении стрептококковой инфекции при тонзиллите будет назначение ингибиторзащищенных β -лактамов (амоксиклав — клавуланат) или других антибиотиков, обладающих активностью по отношению БГСА и стабильностью к действию β -лактамаз (цефалоспорины III и IV поколения).

Острый средний отит (ОСО) — одно из самых распространенных заболеваний детского возраста. К 3-летнему возрасту ОСО переносит 71% детей, а за первые 7 лет жизни до 95% детей имеют в анамнезе хотя бы один эпизод этого заболевания [12, 13]. По данным Health Maintenance Organization, у 48% детей отмечаются однократные эпизоды острого перфоративного или неперфоративного среднего отита в первые 6 мес жизни или более 2 эпизодов за 12 мес жизни. Результаты микробиологического исследования пунктата барабанной полости свидетельствуют о том, что, как и при остром риносинусите, основными возбудителями острого среднего отита являются *Streptococcus pneumoniae* и *Haemophilus influenzae* — именно те микроорганизмы, различные штаммы которых заселяют носоглотку большинства детей. Эти два микроорганизма составляют в сумме примерно 60% всех бактериальных возбудителей заболевания [13, 14]. Реже высевают *Moraxella catarrhalis* (3–10%), *S. pyogenes* (2–10%), *S. aureus* (1–5%). Около 20% посевов из барабанной полости оказываются стерильными. Значительная часть ОСО имеет вирусную этиологию. Определенную роль в этиологии ОСО могут играть *Chlamydia trachomatis*, *Chlamydophila pneumoniae* и *Mycoplasma pneumoniae*, которая, в частности, способна вызывать буллезный геморрагический миригит.

В настоящее время установлено, что бактериальным популяциям как в естественных условиях обитания, так и при культивировании *in vitro* свойственно образова-

ние биопленок — организованных сообществ бактерий, обладающих уникальными биологическими свойствами. Одним из таких свойств является способность к стойкой колонизации разнообразных биотопов (от греч. *topos* — «место») — областей организма человека, характеризующихся определенными анатомо-физиологическими особенностями и высоким уровнем резистентности к антибактериальным средствам.

Р. А. Chole и В. Т. Faddis, изучавшие биопленки в небных миндалинах, отмечают, что некоторые из них превышали в диаметре несколько миллиметров и могли быть видны невооруженным глазом [15]. Существуют свидетельства образования биопленок на поверхности слизистой оболочки среднего уха при остром и хроническом среднем отите [16], в матриксе холестеатомы, ткани небных миндалин при тонзиллите [17].

Бактерии в составе сообществ выживают в присутствии многих антибиотиков, взятых в количествах, значительно превосходящих минимальную подавляющую концентрацию. В состав поверхностной оболочки, ограничивающей сообщество бактерий от внешней среды, входят липиды, формирующие мембраноподобную структуру. Такая оболочка может служить преградой на пути антибиотиков в биопленку. Антибиотики, не проникающие в биопленку, способны справиться только с отдельно существующими планктонными клетками, в то время как бактерии внутри биопленки способны размножаться и вновь диссеминировать после завершения курса лечения, приводя к хронизации процессов и рецидивированию заболевания. В связи с этим способность антибактериального препарата проникать внутрь биопленок так важна с позиций эрадикации патогена и профилактики развития осложнений.

Открытие и внедрение в медицину оральных цефалоспоринов III поколения существенно расширило возможности лечения инфекционно-воспалительных заболеваний в стационаре и амбулаторной практике.

Одним из представителей теперь уже значительной группы оральных цефалоспоринов III поколения является цефтибутен (Цедекс), близкий по спектру действия парентеральным препаратам той же генерации, уступая им по активности в отношении грамположительных микроорганизмов [18]. По механизму антибактериального действия цефтибутен принципиально не отличается от других β-лактамов — ингибиторов синтеза пептидогликана — полимера, составляющего основу клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Мишенью действия β-лактамов являются ферменты транс- и карбоксипептидазы, называемые так из-за их способности взаимодействовать с пенициллинсвязывающими белками. Как и другие цефалоспорины, цефтибутен демонстрирует относительно длительный постантибиотический эффект, особенно в отношении клинически значимых возбудителей респираторных инфекций. Продолжительность эффекта цефти-

бутена на большинство возбудителей составляет 1–2 ч, в присутствии субингибирующих концентраций антибиотика он еще более пролонгирован и усилен, в частности против *M. catarrhalis* [18].

Цефтибутен характеризуется высокой активностью в отношении большинства представителей энтеробактерий (*Escherichia coli*, *Klebsiella oxytoca*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Providencia*, а также *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*). Умеренно чувствительны к цефтибутену или устойчивы к его действию *Morganella morganii*, *Citrobacter freundii*, *Serratia marcescens*. Чувствительны к цефтибутену *Neisseria meningitidis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *H. influenzae*, *M. catarrhalis*, вне зависимости от продукции ими β-лактамазы. Среди других грамотрицательных бактерий на терапию цефтибутеном реагируют *Helicobacter pylori*, *Aeromonas*, *Brucella spp.* и др., что составляет важную особенность спектра действия данного антибиотика.

Среди грамположительных микроорганизмов стрептококки характеризуются значительными межвидовыми различиями в степени чувствительности к цефтибутену. Наиболее чувствительны к антибиотику β-гемолитические стрептококки группы А, наименее — β-гемолитические стрептококки группы В. Одна из причин неэффективности пенициллина при стрептококковом тонзиллофарингите — подавление пенициллинами представителей нормальной микрофлоры ротоглотки (прежде всего α-гемолитических стрептококков), которые конкурентно препятствуют колонизации БГСА. Проведение реколонизации ротоглотки α-гемолитическим стрептококком после курса пенициллина у пациентов со стрептококковым тонзиллофарингитом значительно снижает частоту возникновения рецидивов заболевания. Цефтибутен не влияет на α-гемолитические стрептококки, способствует снижению частоты последующих рецидивов [19].

К наиболее важным особенностям действия цефтибутена относится его высокая стабильность к разрушающему действию β-лактамаз, в т.ч. расширенного спектра действия. По степени стабильности к β-лактамазам расширенного спектра действия, продуцируемым *E. coli* и другими энтеробактериями, он превосходит в ряде случаев парентеральные цефалоспорины III поколения и сравним с цефпиромом, цефепимом — цефалоспорины IV поколения [17].

Цефтибутен имеет свойство накапливаться в тканях, обеспечивает высокую концентрацию в очаге воспаления, что, с одной стороны, повышает его эффективность, с другой — снижает риск развития побочных эффектов. Его концентрация в отделяемом носа, секрете трахеи и бронхов составляет 50% от обнаруживаемой в крови; в жидкости среднего уха при остром среднем отите — 70%. Эффект цедекса в биопленках продемонстрирован в отношении штаммов *E. coli* и *P. mirabilis*, выделенных из респираторного тракта и мочевыводящих путей. Одинарная-двойная минимальная ингибирующая концен-

Таблица. Сравнительная эффективность цефтибутена при остром среднем отите у детей (по данным Mc. Linn S.E, 1993)

Антибиотик	Число больных	Эффективность, %	
		клиническая	бактериологическая
Цефтибутен	429	90–98	94
Амоксициллин/клавуланат	98	97	–
Цефаклор	106	88–97	76
Цефиксим	78	95	–

Рис. Частота клинического успеха и элиминации возбудителя после 10-дневного курса антибактериальной терапии (по данным М.Е. Pichichero, 1995)

терапия цефтибутена влияет на продукцию 2/3 штаммов кишечной палочки и протей и снижает число штаммов в эпителиальных клетках образцов на 35% эффективнее по сравнению с контролем [18].

Результаты клинических исследований показали эффективность применения цефтибутена в дозе 400 мг в сут для лечения тонзиллофарингита у взрослых, вызванного стрептококком группы А, курсами менее 5 сут, а также сравнимую эффективность цефтибутена и азитромицина в режиме 1 раз в сут [16].

Цефтибутен рекомендован и эффективно применяется в детской практике при лечении тонзиллофарингита и отита. Обоснованность применения цефтибутена у детей по показаниям обусловлена такими ключевыми свойствами антибиотика, как высокая активность *in vitro* в отношении *H. influenzae*, *M. catarrhalis*, многих энтеробактерий; стабильность к действию β-лактамаз, в т.ч. расширенного спектра; высокая биодоступность; пролонгированная фармакокинетика, обеспечивающая удобство режимов применения; приятный вкус детской лекарственной формы цефтибутена — суспензии.

Клиническая и микробиологическая эффективность Цедекса в терапии острого тонзиллофарингита подтверждена М.Е. Pichichero в 1995 г. в рандомизированном простом слепом исследовании, направленном на сопоставление эффективности и безопасности применения цефтибутена (9 мг/кг один раз в день) и пенициллина V (25 мг/кг/день) в форме суспензий для приема внутрь на протяжении 10 дней у 426 детей и подростков с тонзиллофарингитом, вызванным β-гемолитическими стрептококками группы А (рис.).

При остром среднем отите у детей в возрасте от 6 мес эффективность Цедекса (9 мг/кг 1 раз в сут) оценивалась в сравнении с амоксициллином–клавуланатом, цефаклором, цефиксимом, применяемыми в обычных дозах в течение 10 дней. Эффект лечения контролировали через 1–3 дня после его окончания и спустя 2–4 нед (табл.).

Клиническое излечение при остром среднем отите у детей наблюдали в результате применения цефтибутена в 90–98% случаев, элиминацию возбудителя — в 94%. При сравнительных результатах лечения цефтибутоном и другими антибиотиками к преимуществам первого можно отнести более удобный режим применения, лучшие отдаленные результаты лечения, хорошую переносимость [20].

К числу важных преимуществ цефтибутена, с точки зрения его переносимости, относится минимальное воздействие на кишечную микрофлору [20, 21]. Это связано с тем, что антибиотик быстро всасывается в тонком кишечнике, выводится преимущественно почками, практически не метаболизируется в печени. В толстом кишечнике цефтибутен инактивируется β-лактамазами *Bacteroides fragilis*, главным компонентом анаэробной флоры кишечника. Дegradaция антибиотика в толстом кишечнике способствует сохранности нормальной кишечной микрофлоры с минимальными разрушениями нормальных микробных биоценозов [21].

Таким образом, полученные данные характеризуют Цедекс как перспективный оральный цефалоспориин III поколения, обладающий высокой антимикробной активностью, отличной клинической эффективностью, хорошей переносимостью.

REFERENCES

1. Mal'tseva G. S. *Ros. otorinolaringologiya — Russian Otolaryngology*. 2009; 3 (40): 149–156.
2. Garashchenko T. I., Bogomil'skii M. R. *Makrolidy v terapii ostrogo tonsillita i ego oslozhenii u detei. Metodicheskie rekomendatsii* [Macrolides in Therapy of Quinsy and its Complications in Children]. Moscow, RGMU, 1999. p. 28.
3. Garashchenko T. I., Bogomil'skii M. R., Shishmareva E. V. *Detskie infektsii — Child infections*. 2004; 1.
4. Pal'chun V. T. *Vestnik otorinolaringologii — Bulletin of Otolaryngology*. 2006; 6: 7–8.
5. Ovchinnikov A. Yu., Syrkin A. L., Gabedava V. A. etc. *Ros. otorinolaringologiya Pril — Russian Otolaryngology Appendix*. 2007; 497–502.
6. Mal'tseva G. S. *Consilium Medicum — Consilium Medicum*. 2010; 12 (11).
7. LaPenta D. et al. Group A streptococci efficiently invade human respiratory epithelial cells. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*. 1994; 91 (25): 12115–12119.
8. Lilja M., Raisanen S., Stenfors L. E. Initial events in the pathogenesis of acute tonsillitis caused by *Streptococcus pyogenes*. *Int. J. Pediatr Otorhinolaryngol.* 1998; 45 (1): 15–20.
9. Park H. S. et al. Membranous cells in nasal-associated lymphoid tissue: a portal of entry for the respiratory mucosal pathogen group A streptococcus. *J. Immunol.* 2003; 171: 2532–2537.
10. Post J. C. *Laryngoscope*. 2001; 111: 2083–2094.
11. Strachunskii L. S., Kamanin E. I., Tarasov A. A. *Zhurn. ushn. nos. i gorl. bolezni — Journal of ear, nose and throat diseases*. 2002; 5: 83–91.
12. Daly K. A., Brown J. E., Lindgren B. R. et al. Epidemiology of otitis media onset by six months of age. *Pediatrics*. 1999; 103: 1158–1166.
13. Healy G. B. Otitis media and middle ear effusions. In: Ballenger J. J., Snow J. B., Ed. *Otorhinolaryngology: Head and Neck Surgery*. 15th edition. Baltimore: Williams & Wilkins. 1996. P. 1003–1009.
14. Bergeron M. G., Ahroheim C., Richard J. E. et al. Comparative efficacies of erythromycin–sulfoxazole and cefaclor in acute otitis media: a double blind randomized trial. *Pediatr Infect Dis J*. 1987; 6: 654–660.
15. Chole R. A., Faddis B. T. *Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg*. 2002; 128: 1129–1133.
16. Raynen M. G., Zhang Y., Gorry M. C. et al. *JAMA*. 1998; 279: 296–299.
17. Jacoby G. A., Carreras I. Activities of beta-lactam antibiotics against *Escherichia coli* strains producing extended spectrum beta-lactamases. *Antimicrob Agents Chemother*. 1990; 34 (5): 858–862.
18. Kusers A., Crowe S. M., Grayson M. L. et al. The use of antibiotics. *Clinical review of antibacterial, antifungal and antiviral drugs*. 5th. ed.
19. Falck G., Grahn-Hakansson E., Holm S. E. et al. *Acta. Otolaryngol.* 1999; 119 (8): 944–948.
20. Budanov S. V. *Antibiotiki i khimioterapiya — Antibiotics and chemotherapy*. 1998; 4: 33–39.
21. Brismar B., Edlund C., Nord C. E. Effect of ceftibuten on the normal intestinal microflora. *Infect*. 1993; 21: 373–375.